

**LETTERA
SULLA
CIRCOLAZIONE
DEL FLUIDO
SCOPERTA IN...**

Bonaventura Corti





CHIARISSIMO
SIGNOR CONTE.

L'Onor, che mi fate accordandomi la vostra amicizia, e corrispondenza, chiarissimo Signor Conte, il coraggio, che m' inspireate per le ricerche delle verità naturali, e il vantaggio, che traggio da' vostri consigli, domandano, che io vi renda conto di alcune cose, che mi è riuscito di rintracciare nella passata estate. So io, e sa tutto il mondo qual sia il vostro gusto per ogni maniera di Letteratura, e sopra

A 2

tut-

A

tutto quali facciate accoglienze alle filosofiche fatiche, per ripromettere alle mie osservazioni il vostro gradimento. Prima però di venire a i fatti, sofferite che vi ricordi, come un certo Sig. N. N. (a) siasi scatenato contro la mia opera (b), nella quale ho trattato della Tremella, e della circolazione del fluido, che ho scoperta nella *Cara*. Un'Analisi delle produzioni del Sig. N. N. fu quel gusto medesimo, ch'egli ha praticato più di una volta sulle altrui, comporrebbe un volume, il quale gli renderebbe la più bella pariglia del mondo. Ma ben lontano da simile vendetta, duolmi piuttosto, che da coteste passionate critiche gli stranieri prendan motivo di viemaggiormente insultare all'italiana letteratura.

Tra l'altre cose, alle quali farò risposta di quando in quando scrivendo su tali materie, benchè rispondasi co' sentimenti espressi nel mio libro; tra l'altre cose, dissi, il Sig. N. N. condanna le conseguenze tutte, che in forza dell'*analogia* si voleessero trarre, siccome ho fatt'io, dalla *Cara* all'altre piante riguardo al movimento del fluido. Per fiancheggiare la sua condanna

[a] Antol. n. 46. e segu.

[b] Osserv. microsc. Lucca 1774.

danna reca l'esperimento del Sig. Mustel (c) e dice, che tale cimento *rende impossibile la circolazione del fluido nelle piante*. Conferma tutto questo colle sue stesse osservazioni riuscite inutili su di un gran numero di piante acquatiche, al pari, e più della Cara capaci di quel movimento del fluido.

Allora quando non si era scoperto neppur ombra di circolazione nelle piante, cotesto fenomeno si credè probabilissimo in forza della semplice analogia tra gli animali, e le piante. Ora che abbiamo l'intera famiglia delle Care fornite di una innegabile circolazione, non solamente non vuolsi ammettere l'analogia tra piante, e piante, ma rispetto all'altre si stabilisce una *impossibilità*. Allorchè però il Sig. N. N. stabilì quell'*impossibilità* di circolazione in altre piante non si ricordava più, che poche linee prima avea asserito, che appena letta la mia opera trovò *quel moto singolare* (del fluido nella Cara) *in diverse piante acquatiche, che allora potè avere alle mani....* Nè dalle poche osservazioni tumultuariamente fatte sopra altre piante gli è poi parso di ritrovarci gran diversità di

A 3

moti

[c] Scelta di Opuscoli: transf. filosof. Milano, Vol. 4.

pieſi neppure in tutti gli animali alla medefima maniera. E ſi vorrà poi lo ſteſſo negli animali, e nelle piante? Per poco che ſi riſſetta ſu gli organi degli uni, e dell' altre ſi vedrà in quali termini debba eſſere propoſta la *quiſtione della circolazione del ſucchio nelle piante*. Anche quì m' aſſiſte l' autorità del ſovrallodato Sig. Bonnet con altra lettera de' 26. Gennajo 1775. (e).

Ritornando alle piante del Sig. N. N. perchè mai non ha voluto nominarle, nè accennare il modo, con cui le ha eſaminate, giuſta il coſtume degli oſſervatori? Se ha dato il nome a quelle, che l' hanno ſtancato indarno, perchè negarlo a quelle, che gli hanno fatto vedere un fenomeno, a detta di lui, *ſingolare, e prima affatto ignoto agli oſſervatori*? Nominandole neſſuno avrebbe avuto difficoltà di credere le ſue oſſervazioni tutte *originali, e ſenza replica, per ſin-*

A 4

golari

[e] La fameuſe queſtion, ſi la ſève *circule* dans les plantes n'a pas toujours été propoſée de la manière la plus propre à fixer l'état de la queſtion. On a demandé pour l' ordinarie, ſi la ſève *circuloit* dans les plantes comme le *Sang* dans les animaux? Sous ce point de vue, il eſt bien evident, que la queſtion doit être décidée *negativement*.... mais il peut y avoir dans l' immense étendue du ſiſtème organique bien des eſpeces de *circulation*, dont nous ne ſçaurions nous former aucune idée, & que l' experience ſeule peut nous faire connoître.

golari , sorprendenti , nuove , e paradosse che possano parere , sapendosi ch' egli ha veduto più in tre giorni , di quello abbiano veduto altri , e anche male in tre anni . Io non so persuadermi , che quelle piante sieno state Care da lui non ravvisate per tali , mentre sentenziando francamente , benchè senza alcuna prova , che io mi sono ingannato nel nominare la prima delle mie Care , egli debb' essere un eccellente Botanico . Io non vorrei , che qualcheduno meno scrupoloso prendesse motivo da quel silenzio di formare più di un sospetto . Ma comunque ciò sia venghiamo una volta alle mie osservazioni .

Dopo aver veduto il fluido circolante nella Cara io non ho lasciato di esaminare molt' altre piante su l'idea , che la Cara non dovesse essere l'unico esempio in natura ; ma sempre indarno . Finalmente verso la metà di Agosto di quest'anno 1775. portatomi in campagna riscontrai sulla sponda di una vasca , quella piantarella , la quale vedesi rappresentata al naturale nella figura prima . Le sue radici , le quali stanno piantate profondamente nella terra sono *aaaa* , bianchicce , e capillari : i vecchi tronchi *bbbb* rossigni , o di color di carne : i giovani *cccc* altri verdognoli , altri *conerognoli* . Tutti cotesti
tron-

tronchi separansi facilmente gli uni dagli altri, e però la pianta comparisce affai fragile. Le foglie *ooo* spuntano su l'estremità de' tronchi, tre su ciascheduno, rovesciate, e piegate in arco verso il tronco sottoposto, e sono armate di punte all'uno, e all'altro lato. Dal mezzo dell'unione delle tre foglie sorgono i nuovi rami, e ivi pure spuntano i semi *eeee*. Nel sito dell'unione de' tronchi di qualche data pullulano nuove radici, per le quali la pianta serpeggia quasi fosse una gramigna acquatica. Coteſta pianta veduta con occhio armato di lente fortissima fa vedere i vecchi tronchi come nella figura seconda: un pezzetto di uno di queſti tronchi tagliato per ~~lo~~ lungo offervafi nella figura terza. Per mezzo di queſte porzioncelle, che ſono molto trasparenti, la lente più forte manifeſta, che le parti di queſta pianta ſono un teſſuto di *vaſi*, o ſieno *tubetti*, ovvero *otricelli* ſtiacciati, più o meno lunghi, più o meno larghi, giuſta la diverſità de' tronchi interi. Que' vaſi ſono chiuſi a i lati da fibre *longitudinali*, e alle eſtremità da fibre *tranſverſali*, o *diaframmi*. Le radici, e le foglie hanno il medefimo teſſuto a proporzione. La figura quinta è una foglia ingrandita col microſcopio. Voi adeſſo Sig. Conte, ſiccome

amante della Botanica, saper vorreste il nome di cotesta pianta. Io vi dirò una volta per sempre in questa lettera, che l'unico mio scopo è stato quello di cercare se il fluido circoli, o no nelle piante, che ho esaminate, poco o nulla curando i nomi de' Nomenclatori, per non aver avuto comodo di osservare la *fruttificazione*, cosa necessaria per lo più per collocarle nelle loro classi, e rinvenirne le specie. Contentatevi dunque di una breve descrizione tal quale sarà, e del nome volgare per lo più, e comune senza obbligarmi a guarentirvi presso i Nomenclatori. Riguardo poi alla pianta testè descritta, io sospetto che sia una *Cara*, avvegnachè nè io, nè altri pratici nella Botanica abbiano potuto riscontrarla con sicurezza tra quelle di Vaillant, e di Linneo. Per ora la chiamerò la *mia pianta* a distinzione dell'altre.

Su l'idea, che la circolazione fosse *unica*, o *una* in tutta la pianta, siccome avea sospettato nella mia operetta, scelsi da prima una porzione di pianta colle sue radici, e a molti tronchi, e l'accolsi in un vetro concavo con acqua, giacchè cotesta pianta non vive che tuffata nella medesima. Impuntati più rami senza profittar nulla, finalmente mi parve di vedere del
 fluido

fluido in movimento all'uno de' lati di un ramo un poco trasparente, che contemplava. Fatta e su questo, e su d'altri rami e tronchi seriosa ricerca, giunsi finalmente ad assicurarmi, che dentro a certe parti componenti i tronchi, e che pareano *tubetti* chiusi a certe distanze, moveasi un fluido grossolanetto, ascendendo rasente un lato, piegando giunto come a un diaframma, poi discendendo rasente l'altro opposto lato senza arrestarsi mai, come ne' tubetti *aaa*, *bbb*, *ccc*, fig. 2. Ripetuta moltissime volte l'osservazione, l'apparenza fu sempre la medesima, e costante; onde appresi, che nella mia pianta il numero delle circolazioni era eguale a quello de' tubetti, o vasi interi, e visibili. E a togliere per sempre ogni contrasto dichiaro, che per *circolazione di fluido* in questa, e in altre piante intendo quel movimento, per cui il fluido si vede scendere radendo un dato lato del vaso, piegare giunto che sia all'estremità del medesimo, salire lungo il lato opposto, passar in vicinanza dell'estremità superiore alla banda di prima, e rifare perennemente la stessa via. Ovvero intendo quel movimento, onde il fluido dentro le parti di una pianta è portato in giro ascendendo, e discendendo per istrade all'occhio almeno diverse; qualun-

que poi sia la cagione di questo fenomeno. Così non si negherà forse più la circolazione alla Cara, e all'altre piante, perchè hanno la disgrazia d'essere senza cuore, senza arterie, e senza vene.

Dopo l'accennata osservazione credetti di poter separare i tronchi dalla pianta, e così esaminare il fenomeno più comodamente. Eseguirò ciò, venni all'esame de' tronchi, e nelle parti trasparenti de' medesimi riscontrai la circolazione in pieno vigore. Vidi inoltre, che tra i vasi forniti di circolazione spiritosa ve n'avea di quelli, il cui fluido era senza movimento. Cercai se il fluido visibile di un vaso passava nell'altro; nè fu possibile vedere cotesto passaggio. Pensai allora, che la circolazione potesse mantenersi anche tagliando i tronchi per lo lungo, avendo pria veduto, che non toglievansi tagliandoli di traverso. Una forbice affai fina eseguì il mio disegno, e posì le due porzioni del tronco tagliato in vetro concavo con un pocolino d'acqua. Recato il vetro al microscopio fui contentissimo della trasparenza, poichè le parti mi comparvero come il pezzetto rappresentato nella fig. 3. ma tutto il fluido fu senza movimento, benchè visibilissimo dentro ai vasi.

Re-

Replicai più volte l'esperimento, e i risultati furono i medesimi. Memore, che anche nella Cara s'arresta il fluido circolante qualora gl'internodi sieno agitati, o percossi, indi a poco a poco ritorna in giro come dapprima (*f*), sperai, che anche ne' miei pezzetti dovesse accadere la stessa cosa. Di fatti postone uno a disamina, dopo qualche tempo, ritrovai il succhio in pienissima circolazione, la quale mi presentò uno spettacolo in parte nuovo. I vasi, e la circolazione compariscono realmente come nella figura terza; ma per chiarezza maggiore ho creduto bene servirmi della figura quarta. Dissi altrove, che i vasi del succhio sono lateralmente terminati dalle fibre longitudinali *AB*, *AB*, fig. 4. che scorrono la lunghezza del tronco; e sono terminati da fibre trasversali o diaframmi in *ab*, *dh*, *g*, *m* irregolarmente disposti, almeno all'occhio. Ora se l'osservatore sciegliesse per unico punto di vista i soli due vasi segnati 1, e 2, vedrebbe il fluido nel primo passare da *a* in *b*, e scendere in *d* lungo il lato *bd*, radere il diaframma *d*, salire in *c*, e ritornare in *a*. E nel secondo

[*f*] Questo fenomeno per isbaglio non fu stampato nel mio saggio su la circolazione della Cara. Lucca 1774.

condo osserverebbe i corpicciuoli calare da *b* in *g*, passare in *e*, salire per *i*, e ritornare in *b*. Ma l'osservatore vede anche i vasi 3. e 4. e molt' altri nello stesso tempo, e però da prima non gli si affacciano che movimenti confusi, cioè a dire, vede nettamente il fluido scendere da *b* in *d*, e da *b* in *g*: ma in *e* scorge un filetto che ascende, e in *r* un filetto che discende, e sembrano toccarsi più, o meno: in *i* vede l'ascesa, in *o* la discesa; in *c* il fluido s'alza, in *n* s'abbassa. Questo fenomeno nasce dall'uniformità del movimento del fluido ne' vasi, e da i diaframmi irregolarmente collocati a traverso le fibre longitudinali.

Dopo questo viene un altro punto di vista, che a prima giunta talvolta imbarazza. L'osservatore persuaso, che il fluido piega ne' diaframmi, s'avvisa che molti filetti traversano i medesimi diaframmi, e passan oltre liberamente. Osservi lo spettatore i quattro filetti di fluido *g*, *e*, *i*, *o* de' vasi segnati 5., 6., vedrà i due *g* e ascendere, e i due *i* e discendere dentro al rispettivo loro vaso, e nello stesso tempo. Questo è un errore, il quale nasce perchè l'uno de' vasi giace in parte sotto dell' altro. E siccome la loro profondità è pochissima, l'osser-

servatore di leggieri li crede nel medesimo piano. Per chiarirsi dell'inganno osservinsi le quattro fibre longitudinali, che formano i vasi delle circolazioni. Queste sono $CHED$: cerchinfi i diaframmi del vaso s , e si troveranno essere aa , bb , poichè il fluido, che ascende per g passerà da a in a , scenderà in i , e in b , spingerassi in b , e salirà in g radendo le fibre longitudinali formanti questo vaso, e che sono Cb , Eb . Tengasi ora dietro al fluido che ascende in e , vedrassi che i diaframmi, ne' quali va a piegare sono dd , cc , che le fibre longitudinali di questo vaso sono Hc , Dc , e in conseguenza dell'uniformità del movimento nel fluido, deve ascendere da e in d , passare in d , e discendere in o . Ed ecco come a un tempo stesso tolgasi l'equivoco di due filetti ascendenti, o discendenti nel medesimo vaso, e insieme onde sia, che veggansi de' filetti traversare liberamente de' diaframmi, come dec che taglia aa , e aib , che traversa cc . Se i lati g , e , i , o s'accostassero per modo, che l'uno appena giacesse fuori dell'altro, come nel vaso segnato 7., allora vedrebbonfi due filetti di fluido toccantisi apparentemente, ed ascendere per xyb , e due altri discen-

scendere per bmt , tagliandosi in t , in b , in z . Finalmente se il lato dell' ascesa del fluido di un vaso giaccia sotto al lato della discesa di un altro, o al contrario, vedrannosi due filetti di fluido l' uno ascendente, l' altro discendente nel medesimo luogo apparente. Ecco i principali fenomeni da me osservati nella circolazione della mia pianta, a i quali, cred' io, ridurrannosi gli altri forse da me non osservati per essermi mancata la pianta medesima.

Ella è questa la circolazione da me osservata nelle parti della mia pianta trasparenti, e sane. Ma se avvenga, che all' osservatore presentinsi de' vasi, i quali abbiano sofferto, lo che accade di leggieri, non solamente qualora i tronchi sannosi in pezzi, ma ancora quando si maneggiano, o si scuotono, allora incontrasi ne' medesimi il fluido stagnante, il quale o non circola mai più, o infelicamente. Siccome nella Cava, così anche in questa pianta i corpiccini grossolani sono portati in giro da una linfa per se medesima invisibile. Io ho inferito l' esistenza di quella linfa e dalla distanza, e corso talvolta interrotto de' globettini giranti, e da strane irregolarità, le quali osservansi nel movimento del fluido de' tubetti offesi. Conciossiachè laddo-
ve

ve ne' vasi fani i globettini più, o meno celeramente girano, radendo sempre i lati, e i diaframmi; ne' vasi sconcertati non serban legge. Voi li vedreste ascendere, e discendere rasente i lati per qualche tratto, poi recarsi verso il mezzo, arrestarsi, tornare indietro, o muoversi obliquamente. Scorgereste i corpicciuoli unirsi in un dato sito, e soffermarsi, poi mettersi in cammino, specialmente all' urto di qualcheduno che sopraggiunga con violenza. Questa linfa ragunasi talvolta a i diaframmi, e manifestasi sott'ombra di nebbietta, la quale sembra ingojare i corpiccini ivi arrestati. Poi via via fassì strada, svanisce la nebbietta, e i corpiccini si muovono. Pochi giorni dacchè ebbi ritrovata l'unica ciocchetta di questa pianta, m'accorsi, che una certa produzione acquatica a guisa di muffa copriva i tronchi, e rendevali opachi. Per andare innanzi nelle osservazioni fui costretto a tergere le parti che volea esaminare con un pennellino. Ma il tergere i tronchi era lo stesso, che far nascere ne' vasi della superficie ripulita una quantità di corpi ritondastri, e rispettivamente grossissimi, i quali o restavano sempre senza moto, o alfine moveansi senza legge. Sospetterai, che que' corpi grossi fossero particelle.

ticelle d'aria unite insieme per lo fregamento del pennellino: e mi confermai nel mio sospetto dal vedere, che col tempo que' grossi corpi sparivano, o sminuivano notabilmente di mole, e di numero, e talvolta ristabilivasi più o meno la circolazione in alcuni di que' vasi. Certamente dentro a i tronchi v'ha dell'aria più tosto abbondante, conciosiachè se tal' uno si tagli di traverso, del pezzo, che rimane nell'acqua unito al tutto n' esce sovente buon numero di bolle all'occhio nudo visibilissime. Quest'aria sarebbe mai uno de' principali motori del fluido nelle piante? Non ho avuto comodo di fare alcuna sperienza su questa pianta; solamente so, che la Cara nel voto perde la circolazione, e la recupera recata in aria libera.

Se mi si chiedesse se cotesta circolazione abbia leggi costanti, risponderai, essermi paruto, che coteste leggi vi sieno, e che non differiscano molto da quelle che ho stabilite nella mia operetta per la Cara, senza però obbligarmi a difenderle per non aver potuto fare tutte le necessarie osservazioni su la mia pianta. Eccole.

La prima legge si è, che *ogni tubetto, o vaso sano sia fornito di circolazione.*

La seconda: che *la circolazione di un vaso non dipenda da quella dell'altro.*

La

La terza: che *il filetto del fluido giri sempre rasente i lati de' vasi sani adattandosi alle irregolarità de' medesimi lati, se ve n' abbia.*

La quarta: che *il fluido non cangi direzione.* Questa legge merita nuove osservazioni. Ho veduto il fluido 8. , 12. , 15. , 20. ore continue scorrere ne' vasi colla stessa direzione; ma questo non basta per una legge.

La quinta: che *il giro del fluido sia uniforme in tutti i tubetti sani.* Anche questa debb' essere confermata da più lunghe osservazioni.

Dopo aver tenuta la mia pianta non molti giorni in vetro pieno d' acqua , m' accorsi , che gettava nuovi rami , e metteva certi corpicciuoli ovali , e scuri che parean semi. Trattine alcuni , gli esaminai senza profitto , perchè opachi. Premendo con ferruzzo sottile verso il mezzo di uno di que' corpicciuoli , mi riuscì di farne sortire una sostanza verdeggiante nel bianco , e granellosa , restando la corteccia vota , e libera . Posi quella corteccia , o buccia nel foco microscopico , e dessa pure mi comparve fabbricata di tubetti la maggior parte di color di corallo , lunghi e stretti. In seguito scoprii dentro a que' tubetti del movimento , il quale poco dopo presentommi una assai bella circolazione , cui ho veduta , e riveduta

duta moltissime volte. Le radici stesse, e le foglie m'hanno mostrato il fluido in movimento, sebbene confusamente. Questo però non toglie, che non sia vero, che il fluido circoli in tutte e quante le parti della mia pianta. M'accorgo d'aver impiegate molte, e forse troppe parole nell'esporre cotesto fenomeno. Ma io l'ho fatto a cagione dell'altre circolazioni, delle quali debbo parlare in seguito, e più, o meno lontane dalla presente. Ho creduto dunque, che l'idea chiara, e distinta di questa giovar possa per intendere tosto l'economia dell'altre, giacchè tutte sono simili.

L'essermi assicurato, che una pianta fabbricata a *tubetti*, ossia *otricelli* potea farsi in pezzi senza toglierle del tutto la circolazione m'impegnò alla disamina di molt'altre. Scelsi da prima le *semiaquatiche*, voglio dir quelle, che vivono colle radici solamente nell'acqua, e col rimanente nell'aria. Le prime furono due sorte di *Crescione acquatico*: l'uno cresce sopra una ciocca sola di radici, e il tronco è fornito di foglie composte a fogliette non del tutto tondeggianti: l'altro vive nell'acque egualmente, ha tronchi più grossi, che gettano radici da pertutto là dove nascono le foglie, pur esse composte, e a fo-

fogliette acuminate. Ora con un rasojo, ora con un temperino, o colle forbici levai dai tronchi dell'uno, e dell'altro crescione de' pezzetti sottili assai, ponendoli in vetri concavi con acqua, e colla faccia della parte tagliata poggiante su l'acqua stessa pensando così di difenderli da un certo raggrinzamento, ch'io temea e per l'azione dell'acqua, e per lo svaporamento dell'umido loro proprio. Esaminai poscia i pezzetti, sempre con lente sommamente acuta, e dopo averli lasciati più o meno in riposo (condizioni, che in avvenire s'intenderanno sempre verificate, se altramente non venga accennato) vidi il tessuto di queste piante abbastanza simile a quello della mia; ma nulla più. Cangiai stille, e i pezzetti tratti da' tronchi li posi nell'acqua de' vetri a rovescio, cioè colla parte tagliata rivolta verso l'aria. Scorsi allora il tessuto con minore difficoltà, trovai de' punti trasparenti, e de' vasi, ma col fluido stagnante. Replicando le prove, giunsi finalmente a vedere de' corpicciuoli di una estrema picciolezza muoversi salendo per una quasi linea biancastra interrottamente, e nascondendosi nello scuro. Can-
giato più volte punto di vista, scorsi de' corpic-
ciuoli ascendenti lungo un lato di un vaso, e
degli

degli altri descendentì, ma radendo il lato di un altro vaso. Dopo un lungo penare incontrai finalmente vasi in tutta la loro lunghezza assai trasparenti e quasi elittici, e dentro a questi vidi il fluido ascendere radendo un lato, piegare nell'acume, e scendere radendo l'altro, indi risalire, e circolare liberamente. Ho ripetuto il cimento moltissime volte usando ancora pezzetti tratti dai picciuoli delle foglie, e sono sicurissimo, che negli accennati crescioni il fluido circola a proporzione come nella mia pianta.

Lieto di cotesto evento trassi dall'acque un *Ranuncolo*, le cui foglie simili alle frecce spieganfi all'estremità de' gambi lisci, e più, o meno lunghi. Questi gambi là dove sorgono su la radice, sono guarniti di due come alette bianchicce, per mezzo delle quali s'abbracciano a vicenda a somiglianza de' finocchi. Levai con destrezza di coteste foglie, e colle forbici tagliai di quelle alette, e le posi in vetri concavi. Venni all'esame di que' pezzetti, e vi riscontrai un doppio tessuto: l'uno rarissimo, e composto di vasi grandi, l'altro serrato, e di vasi strettissimi formanti come delle liste poco trasparenti. In breve mi riuscì di veder girare il fluido nell'uno, e nell'altro tessuto; con questa differenza

renza però, che ne' vasi grandi ho veduto i corpicciuoli salire, piegare, e discendere nettamente, benchè talvolta con lentezza; e nel tessuto ferrato ho veduto l'andare, e il ritornare de' corpicetti, ma rade volte il piegare a cagione della poca trasparenza. Ho poi levato da' gambi delle sottili porzioncelle, siccome nel crescere, e anche in queste ho veduto il fenomeno, quantunque sieno poco trasparenti.

Ritrovai in cert'acqua di fonte un *Ranuncolo*, che avea i gambi, e le alette a i medesimi come il sopra descritto, ma le foglie erano tre; due del pari, e la terza sortiva dall'estremità superiore del gambo assai prolungata. Ogn'una di queste foglie era profondamente divisa in tre parti, e ciascheduna parte era pur essa frastagliata. Feci su le parti di questa pianta quello che ho praticato sulla testè accennata, e i risultati furono i medesimi. Poco dopo m'accorsi, che cotesto ranuncolo vivea ancora fuori dell'acqua ne' siti alquanto umidi. Tosto feci l'esame anche di questi, e ritrovai i medesimi fenomeni.

Traffi e da cert'acque, e da sito umido sì, ma lontano dalle medesime una piantina, i cui tronchi sono grossi come un filo di grosso refe,

e biancastri, e le foglie in cima a i tronchi sono simili a quelle del finocchio, e formano una ciocchetta di un bel verde, e potrebbe fors' essere una spezie di ranuncolo a foglie capillari. Siccome i tronchi di questa pianticella riuscirono opachi, così dovetti dividerli per lo lungo. Posti nel foco del microscopio, mi mostrarono de' vasi strettissimi, e dopo lunga fatica ravvisai dentro ai medesimi il fluido ascendente, e discendente. E questa è la quinta pianta fornita di circolazione.

I risultati favorevoli di coteste due ultime piante crearono in me speranza di ritrovare il mio fenomeno anche in qualche pianta allignante del tutto fuori dell'acque, anzi nell'asciutto. Esaminai dunque un ranuncolo, che cresce fra l'erba de' prati. I fiori sono gialli, i gambi sono vellosi alquanto, e sostentano una foglia sola profondamente divisa in tre parti. Traffi da que' gambi delle porzioncelle sottili, le posi a rovescio ne' soliti vetri, le ricercai con grande attenzione, e con estremo mio piacere vidi il fluido circolante ne' vasi del tessuto. Ed ecco una pianta senza contrasto terrestre fornita di circolazione. Siccome i ranuncoli da me fin ora posti a serio esame mi hanno mostrata la circola-

solazione, così sembra probabile, che tutta la numerosa famiglia de' ranuncoli sia dotata della medesima proprietà.

Fatto coraggio per la testè recata osservazione, presi di mira le piante talmente terrestri, che a saputa di tutti vivessero, e crescessero lontanissime dall'acque. Le prime furono le *Zucche*, le quali compensarono con usura le mie fatiche. A cagione di chiarezza maggiore accennerò la struttura delle Zucche in ciò solamente, che riguarda lo scopo mio, non essendo per ora mio impegno un dettaglio anatomico di veruna pianta. Il tessuto de' tronchi, de' rami, de' gambi delle foglie nella Zucca è il medesimo. Levando da un ramo con un rasojo una porzioncella di pochissima profondità, e posta in vetro concavo con acqua, poi affoggettata a lente acutissima comparisce nell'esterior parte come nella fig. 6. AA sono parti scure: BB trasparenti. Il tutto è un composto di fibre longitudinali, che compariscono annodate quasi da frequenti legami non molto regolari. Su cotesta corteccia veggonsi le spine, di cui è abbondante come x, e sono altrettanti coni di pezzi diversi. Se questa, o altra simile porzione venga rovesciata, e si contempli, come nella fig. 7., tre ma-

B

nie-

niere di vasi ci manifesta , cioè de' sottilissimi formati da fibre longitudinali al solito , come AA *mm*; de' grossi come vescichette BB, ed altri anche più grandi come CC. Coteſta ſtruttura delle Zucche è la medefima a un dipreſſo anche nelle parti dell'altre piante da me contemplate, e delle quali dovrò far parola in ſeguito.

La prima Zucca, che eſaminai fu quella, che a diſtinzione dell'altre chiamo *maggiore*, cioè quella che ha foglie larghiſſime e verdi, fiori gialli, e produce frutta più groſſe dell'altre. I riſultati di moltiffimi cimenti ſu i tronchi, rami teneri, e gambi delle foglie ſono queſti. Levato da un ramo un pezzetto ſottile , e roveſciatolo in un vetro concavo con acqua , indi dopo il ricercato ripoſo eſaminatolo, ſi vede un bulicame, un *Caos* di corpicciuoli in movimento, ma non ſi giugne a determinare la loro direzione. Queſta confuſione compariſce a traverso i vasi grandi CC, ſotto a i quali giacciono i vasi ſottili *mm*. Se col temperino faccianſi due taglietti alla diſtanza di tre , o quattro, o più linee l'uno dall'altro, indi levifi con deſtrezza il pezzetto di ſcorza tra i due tagli , e ſi roveſci dentro al ſolito vetro , veggonſi in
AA,

AA, in *mm* i vasi pieni di linfa con molti corpicciuoli, i quali, a suo tempo, incominciano a muoversi: radendo un lato del vaso, ascendono, piegano, e discendono, poscia risalgono. Costesti vasi sono lunghi ma strettissimi, le loro estremità non sempre appalesansi con nettezza, e però non sempre vedesi il piegare de' corpicciuoli. Col passar dell'ore i pezzetti di corteccia più, o meno s'incurvano, e niente di meno la circolazione del fluido non vien meno; ed io ne ho riscontrati di quelli, e in queste, e in altre piante, i quali formavano già un pezzo d'arco, eppure la circolazione è durata visibilissima per due, e per tre giorni interi. Que' filetti delle zucche attortigliati più o meno a guisa di spire tagliati per lo lungo mostrano qualche circolazione. Sia poi nelle zucche, sia nell'altre piante il fluido circola bensì sotto l'occhio dell'osservatore ne' vasi stretti AA, *mm*, ma non già ne' grossi BB, o CC, e se v'ha qualche movimento egli è assai imperfetto. Non ho però fatte le diligenze possibili per dir francamente, che in que' vasi non v'abbia circolazione. Un altro movimento imperfetto l'ho veduto anche nelle spine *x* fig. 6.

: Dopo questo cimento, diventai il flagello del-

B 2

le

le zucche. La seconda zucca, sulla quale adoperai siccome nella prima, col levar cioè de' pezzetti di corteccia (metodo da me serbato sempre d'indi in poi) fu della stessa razza della prima, salvo che le frutta sono minori assai.

La terza fu quella, che ci somministra grossi frutti, ma incurvati, e le cui foglie sono tempestate di macchie bianchiccie.

La quarta fu simile alla precedente, ma i di lei frutti sono assai più piccoli.

La quinta avea frutta anche più piccole, ed era di quelle che non fruttificano qualora non s'interpichino su per le siepi, o altro postovi a tal fine.

La sesta genera frutta cenerognole, grosse assai, aventi la figura di una pera.

La settima somministra frutta dello stesso colore, ma stacciate quasi a foggia di cipolla. L'ottava fu di quelle, che incerpicanfi, hanno fiori gialli, e producono frutta piccole, legnose, e liscie di color verde diviso in compartimenti da liste bianche.

La nona fu pur essa a frutta legnose e piccanti al giallo, ma bernoccolute.

La decima fu quella maniera di zucche a fiori bianchi, le quali salgono su anche per gli
al-

alberi vicini, e danno frutta grosse aventi la forma di bocce.

L'undecima fu della stessa razza, ma le grosse frutta sono schiacciate. Ecco la serie delle zucche da me poste a cimento, e nelle quali ho riscontrata la circolazione del succhio più o meno spiritosa, più o meno languida a proporzione del loro tessuto, della loro indole e dell'altre circostanze.

Alle zucche ridur si può il citruolo, nella corteccia de' rami teneri, e delle foglie del quale ho riscontrata la circolazione.

Nelle parti tratte dalla pianta del Melone il fenomeno fu meschino, ma fu visibile.

Moltissime volte posi a disamina la pianta del Cocomero nel mese di settembre, ma sempre in vano. Il giorno 12. ottobre riscontrai in un orto una di coteste piante nata di fresco. L'osservai, e ne' pezzetti di corteccia tratti dal tronco la circolazione fu meschina: ma riuscì molto spiritosa nelle porzioncelle levate da' gambi delle foglie, benchè il fluido fosse estremamente sottile. Abbiamo dunque venti piante nelle cui parti la circolazione si è manifestata.

Passiamo ad altre piante. La Consolida maggiore dopo lungo stento mostrommi un'infelice

circolazione. La pianta era d'età molto avanzata : forse nella sua piena vegetazione potrebbe palesare il fenomeno assai meglio.

Tre specie di Malva godono di una circolazione assai plausibile. L'una è a foglie larghe : l'altra a foglie piccoline : la terza è quella malva *ortense*, che produce un fusto molto alto pieno zeppo di fiori emulanti le rose.

Un sedano di fresco nato mi fece vedere il suo fluido in movimento in certi pezzetti, che col rasojo traffi da' gambi delle sue foglie.

Una doppia razza di mercuriale o mercorella da me esaminata mi palesò la circolazione. L'una, i cui semi due a due poggiano sopra un corto gambo, l'altra li mostra raccolti come in grappoli. Il fenomeno è più chiaro, e durevole nella prima.

Un ranuncolo, se non ho errato, il quale alligna ne' prati, e sulle sponde de' fossi, benchè privi d'acqua, è fornito di un fluido circolante, e sottilissimo oltre ogni credere.

Volli esaminare una specie di Calaminta a fiori bianchi, i cui tronchi, e rami aveano del legnoso anzi che no. Tratti de' pezzetti di corteccia gli esaminai, e vi ravvisai la circolazione in un fluido oltre modo sottile. E quello
che

che sembra rimarcabile si è, che non mai prima di 16., o 18. ore potei vedere il fenomeno con sicurezza. Ciò fu sulla fine di Ottobre.

Nello stesso mese venni alle mani de' gambi di fave ripullulate in certa campagna. Gli esaminai giusta il costume, ed ebbi il contento di ritrovare nelle porzioni di corteccia osservate una lodevolissima circolazione.

Ritrovai pur anche delle piante di piselli nati da grani su quel terreno caduti da baccelli maturati nella loro stagione. Ne posi porzioncelle de' gambi nel foco microscopico, e vi ravvisai dentro un' infelice sì, ma reale circolazione.

In altra campagna ritrovai delle ciocche di Spelta ripullulata da grani cadutivi all' occasione della messe. Presa sul nodo superiore una foglia non ancora spiegata, e biancastra la misi in pezzi colle forbici. Ne feci l' esame e vidi que' pezzi fabbricati a liste di un tessuto alternatamente raro, e serrato. Fu in quest' ultimo dove vidi chiaramente il fluido ascendere, e discendere in replicate sperienze.

Anche una certa specie di Marrubio succoso, e allignante all'ombra delle siepi mostrommi la sua circolazione benchè languida.

Dalla costola delle foglie di una sorta di dis-
faco trassi delle solite porzioncelle. Faticai mol-
tissimo, e in fine dopo or, otto, or nove ore,
mi riuscì di assicurarmi di un fluido di una sin-
golare tenuità, il quale vidi più volte ascende-
re, piegare, discendere, e risalire ne' vasi.

Nella corteccia di quella pianta, che i nostri
giardinieri chiamano *Tomates*, e che sembra una
coloquintida, ho veduto un movimento meschi-
no, ma vero.

Ho voluto porre a cimento de' pezzetti di
corteccia levati dalle costole, e da' gambi delle
foglie del Rafano, e della Rapa. In tutte e
due le cortecce ho ravvisata la circolazione;
ma in quelle della rapa era distinta molto, e
sopra tutto era visibilissimo il piegare del fluido
in moltissimi vasi.

L'ultima pianta da me posta a disamina è
stato frumento, che feci nascere in una spugna
inzuppata d'acqua pura verso la metà di No-
vembre. Fu mestieri aspettare molte ore, ma
in fine ebbi il contento di scoprire una reale,
incontrastabile circolazione nelle parti de' teneri
gambi.

Ecco trent'otto piante, le quali, a riserva di
quattro, o cinque, sono puramente terrestri, e
nel-

nelle quali vedesi circolare il fluido più o meno chiaramente ; più o meno spiritosamente a norma della loro indole , e dell' altre circostanze. Non è da dubitare se in primavera non sieno per mostrare questo fenomeno molt'altre piante e chi sa , che tra queste non se ne riscontri ancora qualcheduna delle legnose?

Dite voi ora gentilissimo Sig. Conte , se co-
telli fatti sieno bastanti a sottrarre quella mia
illazione *dalla circolazione della Cara a quella di
alcune altre piante* dalla condanna del Sig. N. N.
e se abbia smentita quella *impossibilità* , che con
tanta franchezza fu asserita da chi protesta , che
ha veduto più in tre giorni di quello *abbia ve-
duto io , e anche male in tre anni* riguardo alla
Cara. Peccato ch'egli non abbia rilevato , che
le mie osservazioni su la Cara sono state di 40.
giorni , o circa , che allora egli restringeva le
sue di *tre giorni a tre minuti secondi*. Questi
pennerà di esaminare tutte coteste mie osserva-
zioni , e aggiugnerne moltissime altre in pochi
minuti ; giacchè le mie sono di cinquanta gior-
ni o circa ; ma non vorrei offenderlo , se gli di-
co , che *per fargolare , paradossa ma vera* che sia
la sua capacità nell' osservare non potrà riuscir-
ne. Un celebre osservatore , a cui ho comuni-

cate queste mie cose è di parere, che molti negheranno i fatti, perchè non giugneranno a vederli. Quindi mi esorta a porre in vista ciò che può fare ostacolo, oppur giovare al riuscimento delle Sperienze. L'autorità di lui è troppo rispettabile perchè io acconsenta, e dica: I. Le osservazioni debbonfi fare in una camera, o luogo caldo assai, e quando quelle tali piante, che pongonsi a cimento, sieno in pieno succhio, o in vigore almeno: II. Egli è cattivo osservare le piante battute lungo tempo dal sole cocente: III. Anche quando sono state agitate dal vento: IV. Quando i rami sono stati portati di lontano con poco riguardo: V. I pezzetti che traggonsi da i rami, o tronchi non sieno troppo profondi, altramente sono opachi; nè troppo sottili, poichè i vasi soffrono sconcerto: VI. L'acqua, che usasi ne' vetri per conservare umida la porzioncella che si esamina debb'esser bollita; l'acqua comune tenuta all'aria abbonda d'insettuizzi infusori, i quali co' loro movimenti disturbano l'osservatore: VII. Bisogna riflettere, che nel levare i pezzetti di corteccia i vasi non ponno non risentirsi più, o meno; l'acqua de' vetri è nemica, o poco favorevole alle piante di terra, e però l'osservatore deve

con-

contentarsi di quello qualunque siasi movimento che può conservarsi nel fluido di que' vasi, ben sicuro, che sarà più spiritoso nelle parti esistenti ne' loro siti naturali: VIII. Voglionci lenti acutissime, e della maggior chiarezza possibile: IX. Le piante d' odor acuto generalmente non mostrano il fenomeno; così fin' ora mi è accaduto: X. Sono necessarj occhi robustissimi, e una sofferenza grandissima.

Io ben m' avviso, che voi, Signor Conte, vorrete propormi non poche quistioni su i fatti che vi ho raccontati, e ne avete ragione. Mi chiederete, a cagion d' esempio, se la circolazione delle mie piante sia *una*, cioè a dire se il fluido, che gira ne' vasi da me osservati passi d' uno in altro, onde per questo mezzo il succhio dalle radici si porti al tronco, da questo a i rami, ec.

Rispondo esser io di parere, che l' affare si passi appunto così. Tralle piante da me accennate la più acconcia a far vedere cotesto passaggio sarebbe stata la *mia*, cioè la prima; ma non mi è riuscito di vedere con sicurezza i corpiccetti grossolani passare d' uno in altro vaso. Ma se non passano i grossolani passerà bene la *linfa*, ossia il fluido sottilissimo.

Se così non è, come intendere che dalle radici il succhio rechi alle cime delle piante terrestri, o *semiacquatiche* ancora? Ho veduto moltissime volte il fluido grossolano stagnare in molti vasi per qualche tempo, mentre il tutto che osservava era in piena circolazione, e poscia mettersi in movimento. E al contrario, cessare dalla circolazione in altri, e dopo più, o meno di tempo tornare in giro, senza poter io immaginar altro, che l'arrivo della linfa nel primo caso, e la sottrazione e il ritorno della medesima nel secondo. I polloncini che spuntano, e divengono rami sono o un prolungamento di fibre omogenee, o lo sviluppo de' germi. Comunque siasi la cosa, egli è questo un effetto del succhio, che s'insinua, e spiega le maglie inviluppate; nè questo può succedere senza il passaggio di qualche succo d'uno in altro vaso. È vero che troncanfi le parti delle piante, e il fluido non esce fuori, ma seguita la sua circolazione ne' vasi interi. Ma troncanfi ancora i vasi della circolazione di certi vermi, nè per questo rimangono le parti senza sangue, poichè i vasi all'istante si chiudono. Tagliando per lo lungo l'unione di due tronchi della mia pianta, si potrebbe forse vedere la continuazione de'

vasi

vafi dall' uno all' altro tronco. Le tinture gioveranno affaiffimo a fparger lume fu queffo punto. Io non ho avuto comodo di fare fomiglianti prove. Coteflo paffaggio del fluido almeno *linfatico* dall' uno all' altro vafò, oltre al costituire una fola circolazione in tutta la pianta, fa pur anche fvanire buon numero di difficoltà riguardo all' economia vegetabile. Allora noi intendiamo l' afcesa del fluido dalle radici alla fommità delle piante, qualunque fia per effere la cagione del movimento del fucchio nelle piante medefime: lo fteffo è ancora della difcesa. Le profonde intaccature praticate ne' tronchi, e che non tolgono il vegetare alle parti fuperiori; gl' innesti d' ogni maniera, e la loro unione col tronco; le piaghe rimarginantifi ec. fono tutti fenomeni, che più non creano l' antica difficoltà.

Se v' ha coteflo paffaggio del fluido, almeno fottile, dall' uno all' altro vafò, udite cofa io penfi del famofo efperimento del Sig. Mustel (a). Già fapete come coteflo filofòfo a' 12. di genajo collocaffe differenti vafi con varie piante; celle dentro, e fuori della fua ferra in vicinan-

za

[a] Scelta d' Opufcoli ec. Milano 1775. Vol. 4.

za della finestra. Da' vasi posti al di dentro per mezzo di fori praticati nella finestra fece passare al di fuori de' rami: e alla stessa maniera da' vasi collocati all'aria libera, e fredda introdusse de' rami nella stufa, chiudendo in seguito, e luttando esattamente i fori. Tutti i rami esistenti nella ferra, e però anche gl'introdotti dal di fuori, germogliarono, e furono verdeggianti come in maggio alla fine di febbrajo. All'opposto tutti i rami, che rimasero esposti all'aria libera, e fredda fuori della ferra furono simili a quelli della campagna. Fu da questa Sperienza, che il Sig. N. N. trasse l'*impossibilità* della circolazione del fluido nelle piante. Ora io dico così: per le mie osservazioni è certo, che il succhio può circolare in una parte di una pianta, non già nell'altra, qualora vi sia una cagione di cotesta differenza. Il caldo senza dubbio è una cagion parzialissima della circolazione, e il freddo all'opposito. Dunque nelle parti delle piante del Sig. Mustel intertenute nel caldo vi dovette essere la circolazione spiritosa, e per conseguente la vegetazione. Nelle parti condannate al freddo non potè averfi la circolazione, o fu lentissima, quale si ha nelle piante della campagna anche in inverno, e però la ve-

ge-

getazione non fu sensibile. Nè io voglio darmi gran pena per ritrovare il fluido necessario alla vegetazione singolare delle parti introdotte nel caldo, poichè neppure il Sig. Mustel si è disturbato per questo. Del rimanente io non ho difficoltà d'asserire, che le parti introdotte dal di fuori avranno bevuto qualche umore dall'aria della serra piena di vapori esalati dalle terre de' vasi, e dalle piante colà dentro racchiuse. Si potrebbe dire, che dalla parte della pianta, il cui vaso restava nel freddo passava nell'altra qualche umore, il quale poco, o nulla ritornava indietro, e non cagionava sensibile vegetazione, anche per la enorme lentezza, con cui moveasi in vasi dal freddo ristretti. Alcune piante impiegano la stessa loro sostanza in dar vita a i nuovi germogli: chi sa, che i rami introdotti nel caldo non facessero altrettanto, o qualche cosa di somigliante? Bisognerebbe ripetere l'esperimento del Sig. Mustel, e tener dietro a tutto severamente per parlare con franchezza.

Se mai sospettaste, che il fluido moventesi ne' vasi, che formano il tessuto delle mie piante fosse l'acqua de' vetri, nei quali serbanfi i pezzetti tratti da' tronchi, la quale s'insinuasse dentro il tessuto, deporrete il sospetto qualora

ri-

riflettiate: I. Che l'acqua , di cui mi sono servito è sempre stata purissima , e quindi priva di que' corpicciuoli , i quali si veggono portati in giro: II. Che qualora si taglino de' pezzetti delle mie piante acquajuole , e terrestri , e tosto s'osservino , l'osservatore vede il fluido linfatico , e grossolano sortire da' vasi troncati: III. che adattando una porzioncella di corteccia a una laminetta , ed esaminandola all'istante , si ravvisa dentro ai vasi quel fluido istesso , il quale poco dopo incomincia a girare , purchè si tenga lontano il secco dalla porzioncella: IV. Che non si può capire , come l'acqua entri ne' pezzetti a cagionare ne' vasi quel movimento. Se volesse un succiamento per mezzo de' tubi capillari , costesti tubi non vi sono . Se amaste un imbevimento coll'ajuto de' pori , perchè quell' acqua non cagiona un semplice inzuppamento , anzi che una circolazione? V. Finalmente , che il fluido , il quale va in giro nella Cara , e nella mia pianta certamente è fluido proprio delle medesime piante: perchè dunque non farallo ancora nell' altre?

Ma replicherete , e perchè usar devesi quell' acqua ne' vetri , dentro ai quali serbanfi le porzioncelle per le osservazioni? e perchè conviene aspet-

aspettare qualche tempo prima di vedere i corpicciuoli in movimento?

Le ragioni di tutto questo sono affai chiare: i pezzetti stesi su di una laminetta di cristallo secca, ed arida in breve pel contatto colla medesima, pel caldo, per l'azione dell'aria, e per la naturale traspirazione perdono l'umido, almeno nelle parti esteriori. Ecco tosto raggrinzamento, sconcerto nel tessuto, e ne' vasi stringentisi opacità, cose tutte le quali nemiche sono al movimento del fluido. Vedrassi, ed io ho veduto qualche cosa in qualche pezzetto esaminato senza porlo nell'acqua; ma da tal vista non avrei mai osato stabilire la circolazione nelle mie piante terrestri. Col moltiplicare le ricerche troverassi forse qualche pianta terrestre, le cui parti potranno esaminarsi intere, e allora vedrassi il fenomeno senza il soccorso dell'acqua. Ho già pensato alla maniera di procurarmi questa osservazione per arte, se non potrò eseguirla naturalmente. Per altro nelle parti della mia pianta, e più facilmente in quelle della *Cara*, anche senza il soccorso dell'acqua, la circolazione persevera, infino a tanto però che il secco non cagiona restringimento. E' poi necessario l'aspettare più o meno, perchè si risvegli la cir-

circolazione , poichè , siccome accennossi altrove , non è possibile levare da un tronco , o ramo una sottile porzione di corteccia senza che tutto il tessuto si risenta , e senza che i vasi ne soffrano . Anzi adattata che sia la porzioncella alla superficie dell' acqua si torce , si piega in arco soventemente a cagione del contatto coll' acqua , e per l' azione dell' aria , cui non soffri mai per lo innanzi ec. Anche gl' internodj della Cara solamente scossi perdono per breve tempo la circolazione .

E giacchè siete stato condannato ad udire ciò , che mi è avvenuto di osservare nella state passata , soffrite , umanissimo Sig. Conte , che io aggiunga una razza singolare di Tremella venutami alle mani . Recatane una ciocchettina al microscopio su l' idea di riscontrare una di quelle Tremelle da me descritte nella mia ope-
retta , fui preso da qualche maraviglia , quando tra la Tremella comune , e gelatinosa , vidi certi grossi fili che pareano vermi da me non pria veduti , fig. 8. Rendutomi attento , scoprii , che que' grossi fili aveano de' movimenti strani ; cioè a dire si dimenavano , e divincolavano per isbarazzarsi dalla ciocchetta , che componevano in un co' filetti gelatinosi maggiori di numero . In
que-

questo mentre altri piegavansi in arco , o formavano cerchi come *aaaa*, altri dondolavano a guisa di pendoli , e le estremità di tutti ora comparivano acute come *ccc*, ora più , o meno ottuse , o smussate , siccome *eee*, variando continuamente sotto l'occhio che osservava. In breve i fili si sbarazzarono , e con movimento assai celere scapparono quà , e là tal'ora soffermandosi tra via , tal'altra senza arrestarsi mai , se non se giunti all'estremità dell'acqua entro la quale moveansi. Allora chi arrestavasi , chi dava indietro , e chi torceva a destra , o a sinistra. In una parola mi hanno fatto vedere tutti i movimenti più , o meno da me descritti riguardo alla Tremella gelatinosa. I diametri di questi fili stanno a quelli della maggiore delle mie Tremelle come 3. a 1. almeno. Sonomi assicurato , che gli accennati movimenti non dipendono da veruna exterior cagione , e però sono propri , e spontanei a que' grossi fili.

Ho potuto facilmente osservare , che cotesti fili moltiplicano per divisione troncandosi di traverso , appunto come le mie Tremelle . Così *aa* fig. 9. è una divisione presta a terminarsi : *cc* è una divisione che si manifesta. I pezzi di fresco distaccati per lo più restano appoggiati con una estre-

estremità al vetro, coll' altra in alto sollevata; oscillano sovente, ed hanno talvolta il movimento *locale*.

Curioso di sapere se questi esseri seccati tornavano in vita coll' acqua, lasciai che la terra, a cui erano uniti, seccasse perfettamente. Dopo due, e più settimane bagnai con acqua quella terra, e in breve ritrovai i fili tornati in vita, e li vidi muoversi, e moltiplicare come da prima.

Feci seccar la terra un'altra volta come sopra, poscia la bagnai, e i fili resuscitarono, e mostraronmi i soliti movimenti, e la loro moltiplicazione. Volea cercare se ricuperavano la vita la terza volta, ma ho creduto meglio l'aspettare a farne la sperienza l'anno venturo avendo serbato quella stessa terra a tale effetto. Io eredo pertanto, che questi grossi fili sieno una vera Tremella gelatinosa, la quale si potrebbe dire *vermiforme*, e forse serve di passaggio, o anello tra le gelatinose e le tenaci, o *reticolare* della mia operetta.

Sul principio di Novembre ho bagnata della terra, a cui era unita della Tremella gelatinosa, e seccata fino fino dalla state del 1773., e quantunque la stagione fosse fredda, e freddo il luogo, in cui l'ho tenuta, pure quella Tremel-

la

la ha recuperata la vita, ed ha moltiplicato assai bene. La proprietà dunque di risorgere nelle Tremelle somiglia a quella de' famosi Rotiferi Levvenhoekiani..

Sono queste le cose, chiarissimo Sig. Conte, che ho potuto rintracciare nella state passata durante la mia villeggiatura. Se io fossi Osservatore più destro, e Scrittore più forbito, forse potrebbero anch'essere degne di voi. Per meschine però che sieno, per me varranno sempre assai, avendomi valuto il potervi testimoniare la verace estimazione, che serbo pel vostro singolar merito, e quel sincero rispetto, col quale mi pregio d'essere.

Spiegazione delle Figure.

LA Figura prima rappresenta la *mia pianta*, che forse è una cara, levata dalla terra, e conservata in un vaso pieno d'acqua. Le radici bianchicce, e capillari sono *aaaa*: i vecchi tronchi di color di carne *bbbb*: i giovani pullulati durante la dimora in quell'acqua sono *cccc*: i semi ovali, e scuri *eeee*. Le foglie ripiegate, o incurvate verso il tronco sottoposto, e dentate ad ambi i lati sono *oooo*.

La

La seconda pone sott'occhio un pezzo di tronco ingrandito col microscopio, a i lati del quale vedesi con difficoltà il fluido circolante ne' vasi poco-diafani *aaa*, *bbb*, *ccc*.

La terza è una porzioncella sottile, e molto trasparente di quel tronco. I vasi sono 1. 2. 3. 4. interi, e forniti di circolazione. I punti denotano il filetto del fluido visibile, e circolante; composto di globettini, i quali ascendono radendo un lato del vaso, piegano, giunti che sieno al diaframma, scendono lungo l'altro lato, e piegano nell'altro diaframma per risalire di nuovo. Nella parte opposta di questo pezzetto i vasi sono gli uni sopra gli altri più, o meno.

La quarta non è, che per mostrare con chiarezza i movimenti del fluido nella terza; e non vi sono, che i filetti del fluido senza i lati de' vasi per non imbarazzare, ed anche perchè talvolta non si veggono a prima giunta: 1. 2. 3. 4. sono i vasi così marcati nella fig. 3. Se l'occhio miri solamente i vasi 1. 2. vedrà il fluido passare da *a* in *b*, scendere in *d*, portarsi in *c*, e ritornare in *a*. Così lo vede ancora discendere da *b* in *g*, recarsi in *e*, e ritornare in *b*. Ma se l'occhio vegga ancora nello stesso tempo i vasi 3., 4., osserva insieme il fluido ascendente,
in

in *e*, discendente in *n*: il vede salire in *i*, e abbassarsi in *o*: calare in *r*, e alzarfi in *e*. Nasce tutto questo dall'uniformità del movimento del fluido ne' vasi, e dalla irregolare giacitura de' diaframmi. Se mirinsi i vasi 5. 6. e in questi i punti *g*, *e*, *i*, *o*, veggonsi i due filetti *g*, *e* ascendere, e i due *i* *o* discendere: di più *e* taglia il filetto *aa*, e *i* taglia *cc*. Il primo nasce dall'uniformità del movimento, e il secondo dal giacere il vaso *dccd* in parte sotto al vaso vicino *abba*. Se i vasi sieno posti quasi l'uno sopra l'altro, come nel sito 7. allora i filetti sono vicinissimi, e sembrano dentro a un vaso solo, e *b m t* discendono, *x y b* ascendono: si tagliano in *t*, sempre in apparenza, in *b*, in *n*, e tra *b* e *n* uno ascende, e va in *i*, l'altro discende, e cala in *m*. Finalmente se il lato dextro di un vaso giaccia vicino al sinistro dell'altro, o al contrario, veggonsi due filetti moventisi a parti opposte.

La quinta è una foglia ingrandita col Microscopio.

La sesta esprime un pezzetto sottilissimo di corteccia di Zucca osservato dalla parte di sopra, ossia parte esteriore. Comparisce un tessuto di fibre longitudinali annodate da frequentissimi, quasi

quasi vincoli. AA, AA, sono parti piuttosto scure: BB, BB sono diafane: *x* è una grossa spina, delle quali abbondano le zucche.

La settima ci fa vedere una porzioncella di corteccia di zucca rovesciata, ed osservata dalla parte di sotto, o interiore. AA è un tessuto di fibre longitudinali formanti de' tubetti piuttosto elittici, strettissimi, e lunghi pieni di linfa, dentro alla quale nuotano frequenti corpicetti, i quali circolano dentro a que' tubetti. BB è un composto di vasi grossi, e corti: *mm* sono vasi come quelli di AA: CC sono più grossi di tutti, contengono del fluido, ma o non si muove, o con poca regola, e lentamente.


L'ottava è una ciocchettina di una razza di Tremella grossissima, il cui diametro sta a quello della maggiore gelatinosa descritta nelle *osservazioni microscopiche* ec. Lucca 1774. come 3. a 1. almeno. Que' grossi fili hanno movimenti spontanei, e compariscono nelle estremità ora acuminati, come *cccc*, ora variamente ottusi, e smusati come *eeee*.

La figura nona è uno di que' fili, che moltiplica la spezie troncandosi di traverso: *aa* è una divisione quasi terminata: *cc* è un'altra, che incomincia.

IL FINE.

Fig. 5

DEHC





88.84328